

Informationsblatt zur Untersuchung der Samenflüssigkeit

Für die korrekte Durchführung der Analyse ist eine sexuelle Abstinenz (Zeit ohne Geschlechtsverkehr/Ejakulation) von mindestens 2 und höchstens 7 Tagen notwendig.

Vor der Samengewinnung wird empfohlen, die Blase zu entleeren und die Hände sorgfältig zu waschen. Dabei sollte nur Seifenlösung verwendet werden.

Die Gewinnung des Samens soll durch Masturbation erfolgen. Bitte verwenden Sie zur Sammlung kein Kondom.

Es ist wichtig, dass die *gesamte* Samenflüssigkeit gesammelt wird. Bitte informieren Sie uns, wenn dies nicht erfolgt ist.

Die Gewinnung muss momentan **zu Hause** erfolgen (aufgrund der Covid-19 Problematik)! Der geeignete Behälter sollte einige Tage vorher im Labor abgeholt werden. Ansonsten bitte die Samenflüssigkeit in einem sterilen Behälter mitbringen.

Wichtig:

- das Material muss spätestens innerhalb einer Stunde nach Gewinnung im Labor abgegeben werden.
- der Transport muss am Körper (z.B. in der Hosentasche) erfolgen. Das Material darf auf keinen Fall unter 20° abkühlen oder über 38 ° C erwärmt werden.
- Bei fieberhaften Erkrankungen sollte die Untersuchung nicht durchgeführt werden

Informazioni al paziente per la raccolta del liquido seminale

Per una corretta esecuzione dell'analisi è necessario rispettare un'astinenza sessuale (senza rapporti sessuali/ eiaculazioni) di minimo due e massimo 7 giorni.

Prima della produzione del liquido seminale si raccomanda di urinare e di lavarsi accuratamente le mani con sapone.

Il liquido seminale deve essere ottenuto tramite masturbazione. Per la raccolta la preghiamo di non utilizzare un preservativo.

È importante che venga raccolto *tutto* l'eiaculato. La preghiamo di informarci se non lo ha raccolto per intero.

A causa della problematica Covid-19 la produzione del liquido seminale deve avvenire **a casa!** La preghiamo di prelevare in laboratorio il contenitore adatto un paio di giorni prima. In ogni caso portare il liquido seminale in un barattolo sterile.

Importante:

- La consegna in laboratorio deve avvenire al massimo entro un'ora.
- Il trasporto deve avvenire vicino al corpo (per esempio nella tasca dei pantaloni) e la temperatura non deve mai scendere al di sotto dei 20° C, né superare i 38 ° C.
- In caso di malattie febbrili in corso il test non deve essere eseguito.