Cannabinoidi nelle urine			
Informazioni generali			
Codice accettazione	111044		
Indicazioni cliniche [RIF.1]	Sospetta assunzione di cannabinoidi, controllo nell'ambito della medicina legale		
Preparazione del paziente	ND		
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	No (richiedibile nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16:00)		
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni	Presso il centro prelievi del laboratorio centrale di patologia clinica di Bolzano Presso tutti i Sert (Servizio per le tossicodipendenze) sul territorio In tutti i distretti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige		
Esecuzione	3 volte alla settimana		
Tempo di refertazione per pazienti esterni	7 giorni		
Preanalitica			
Tipo di campione	Urine		
Tipo provetta	Tappo bianco con inserto nero 10 ml Kit apposito (per il controllo su lavoratori)		
Trasporto del campione	A temperatura ambiente		
Trattamento del campione in laboratorio	Stoccare a temperatura 2 -8°C		
Criteri per la non accettabilità del campione	Non corretta identificazione del paziente, quantità insufficiente		
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	Per i campioni positivi che necessitano la riconferma - a temperatura 2 -8°C fino all'analisi di riconferma		
Possibilità di richiesta su campione già processato	Soltanto per i campioni positivi con la validità medico-legale		
Indicazioni tecniche			
Misurando	Presenza del Δ^9 THC nelle urine		
Metodo [RIF.2]	Test immunometrico		
Range di riferimento [RIF.7]	Si ritiene positivo il campione che presenta la concentrazione ≥50 ng/ml		
Stabilità del campione [RIF.3,7]	18-22ºC: 1gg	2-8ºC: 21gg	-20ºC: 365 gg
Tempo di emivita dell'analita [RIF.8]	>20 ore (25-36 ore)		
Variabilità analitica (%) [RIF.4]	<8,46		
Variabilità biologica intraindividuale (%) [RIF.5]	ND		
Differenza critica (%)[RIF.6]	ND		

Incertezza di misura (Um) omogeno [RIF.4]	5,91-7,77
Interferenze [RIF.2]	Vedi foglietto illustrativo
Significatività clinica	
Valori elevati [RIF.1]	Valori ≥50ng/ml indicano l'assunzione di cannabinoidi
Valori bassi [RIF.1]	Valori <50ng/ml indicano l'assenza di cannabinoidi
Parametri correlati	Creatininuria
Per ulteriori informazioni	
Segreteria	Tel. 0471-908306
Riferimenti bibliografici	[RIF.1]Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012 (8 Auflage) [RIF.2] Bugiardino [RIF.3] World Health Organization, Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 [RIF.4] Dati interni [RIF.5] Desirable Biological Variation Database specifications - Westgard [RIF.6] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0 [RIF.7] Linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine ISS [RIF.8] Zaccà: Manuale di tossicologia forense. Torino 2006
Preparato il	22.11.2019
Prossima revisione prevista	22.11.2022