

Esistono prodotti efficaci per applicazione topica, "spot-on" o collari, il veterinario potrà consigliare il prodotto più adatto all'animale, mentre per la protezione della persona sono sufficienti i repellenti in commercio comunemente utilizzati contro le zanzare. Per limitare al massimo il rischio di introduzione della malattia, visto che recentemente è stata dimostrata la presenza di flebotomi anche in Alto Adige, non si dovrebbero importare cani affetti da leishmaniosi. Dato che la malattia è trasmissibile ad animali e persone, cani malati dovrebbero in ogni caso venir trattati con i prodotti su menzionati. I cani importati o che hanno soggiornato in zone a rischio dovrebbero essere sottoposti ad un controllo veterinario.

A cura di:
Servizio Veterinario Aziendale
Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ANNO 2009

Comprensorio Sanitario di BOLZANO
Tel. 0471 635161

Comprensorio Sanitario di MERANO
Tel. 0473 22236

Comprensorio Sanitario di BRESSANONE
Tel. 0472 801230

Comprensorio Sanitario di BRUNICO
Tel. 0474 586550

Südtiroler
Sanitätsbetrieb



Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige

Azienda Sanitaria de Sudtiroil

LEISHMANIOSI

INFORMAZIONE AI PROPRIETARI DI CANI

Cos' è la leishmaniosi?

È una malattia spesso grave e mortale che colpisce il cane, ma che può anche essere trasmessa all'uomo.

L'agente patogeno della malattia è la Leishmania, un parassita che viene iniettato nel sangue con la puntura di insetti.

Come si trasmette?

L'infezione viene trasmessa da un insetto: il flebotomo.



©M.Maroli

È un insetto, simile ad una piccolissima zanzara, di colore giallognolo, che riposa da fermo in una caratteristica posizione con le due ali in alto chiuse a V. È attivo di sera o di notte e a differenza della zanzara volando non produce alcun ronzio.

I flebotomi si trovano in genere vicino a ricoveri di animali o in zone rurali, boschive e ricche di anfratti umidi dove riposano di giorno e depongono le uova. Per riprodursi la femmina deve prima pungere animali o l'uomo e succhiarne il sangue, così facendo, se infetta, trasmette il parassita.

Dove è diffusa la Leishmaniosi?

La malattia è diffusa in tutta l'area del Mediterraneo. In Europa le zone più a rischio sono nell'Italia Centro-Sud, in Spagna, Portogallo, Francia, Grecia e lungo la Costa della Dalmazia. Nel resto del mondo i Paesi più colpiti sono il Sud America (Brasile), l'India e il Nepal e molti Paesi del Medio Oriente.



Qual'è la stagione dei flebotomi in Europa?

La stagione di riproduzione dei flebotomi dipende dalle condizioni climatiche. In genere nelle zone temperate va da Maggio a Settembre. Ma può estendersi in aree più calde o essere più limitata in zone dal clima più rigido.

Che rischio corre l'uomo?

Anche l'uomo come il cane può contrarre l'infezione se punto accidentalmente da un flebotomo infetto. In Europa i casi di malattia sono rari, tuttavia sono in aumento nelle zone a rischio. Sono più a rischio persone con il sistema immunitario compromesso ed i bambini. La malattia evolve in genere lentamente ed è curabile con farmaci specifici; normalmente è necessario un ricovero ospedaliero.

Quali sono i sintomi nel cane e cosa fare se si sospetta la Leishmaniosi nel proprio cane?

La malattia ha un periodo di incubazione lungo, tra un mese e 3 anni.

Dal momento in cui l'animale è stato punto dal flebotomo all'apparire di sintomi può quindi passare molto tempo. Solo circa il 50% dei cani infettati sviluppa sintomi e l'infezione può facilmente passare inosservata.

In quei soggetti in cui il sistema immunitario non riesce a combattere efficacemente il parassita, la malattia può provocare svariati problemi a livello cutaneo, agli occhi e agli organi interni. Se il cane presenta un generale stato di deperimento, perdita di peso, lesioni alla pelle, intorno agli occhi e sulle zampe nonché è nota una sua permanenza o provenienza da una zona a rischio è opportuno consultarsi con un veterinario per eseguire gli accertamenti necessari (prelievi su sangue e tessuto).



©M.Maroli

È possibile curare il cane?

Nel cane è possibile curare i sintomi provocati dalla malattia, ma non si riesce ad eliminare del tutto il parassita. Il trattamento è di lunga durata e a volte i sintomi possono ricomparire. La cura va decisa caso per caso con il veterinario curante.

Come si previene la leishmaniosi?

Non essendoci ancora un vaccino contro la leishmaniosi è importante prevenire la malattia utilizzando prodotti in commercio che proteggono il cane o la persona dalla puntura del flebotomo. Nelle zone a rischio è consigliabile evitare di tenere all'aperto di notte i cani nel periodo estivo.